

デュタステリドについて

内服方法

1日1回1錠を内服します。

服用のタイミングは食前・食後どちらでも問題ありません。前日の服用から24時間の間隔を空けてください。毎日同じ時間帯に服用するのがおすすめです。
また、噛まないで飲みましょう。

副作用

発生頻度	副作用
1%以上	勃起不全・性欲の減退 射精障害などの性機能不全
1%未満	発疹・頭痛・抑うつ 乳房障害・腹部不快感 など
不明	肝機能障害・黄疸 アレルギー反応等

重大な副作用

肝機能障害

○自覚症状

疲れやすい・体がだるい・力が入らない・吐き気・食欲不振等

○黄疸

白目や皮膚が黄色くなる・尿の色が濃くなる・体が痒くなる等

★これらの症状が出た場合は、すぐに医師に相談してください★

使用禁忌

- ・デュタステリドの成分及び他の5α還元酵素阻害薬に対して過敏症の既往歴がある人
 - ・女性
 - ・未成年
 - ・肝機能に障害のある人
- ※妊娠時に胎児の成長を阻害する可能性があるため女性への投与や皮膚への接触はNGです。

初期脱毛について

デュタステリド服用を開始すると、1~3か月ほどの間さらに薄毛が目立つ場合があります。この現象を「初期脱毛」と呼び、比較的よく見られる症状の一つです。

初期脱毛は、ヘアサイクルが正常に整うことで引き起こされます。デュタステリドの作用によって、柔らかく細い毛が抜け落ち、一時的に薄毛が目立ちます。

ただし、初期脱毛はAGA治療薬の効果があらわれ始めている傾向を示す一時的な症状であり、急激な薄毛の進行ではありません。そのため、経過を見れば問題ないでしょう。また、初期脱毛は、一時的な症状です。ヘアサイクルが「成長期」に突入すればコシとハリのある健康的な髪の毛が生えてきます。

注意

- ・服用中は薬の成分が血液内に残存するため献血ができません
- ・AGAは完治しない為、内服は継続することをおすすめします
- ・女性への効果は認められません
- ・副作用は男性機能に関わるものため、子供を持つことを望んでいる場合は、妊娠に至ってから治療を始めるか、一時的に服用を休止するといいでしょう。
- ・デュタステリドは継続的に服用することでAGAの治療効果が現れるため、休薬期間は最小限に留めるように努めましょう。