

# ～タadalafilについて～

(シアリスジェネリック20mg)

## 内服方法

### 1回1錠を内服します。

タadalafilは服用後、大体30分～1時間程度で効き始め、その後36時間と長い時間効果が持続します。他のED治療薬と比べて効き始めるまでに多少時間がかかるため、性行為の約1時間以上前に服用しましょう。勃起自体は性的刺激に反応して起こります。また、勃起した状態が36時間続くということではありませんのでご安心ください。

## 副作用

- ・顔のほてり・軽い頭痛・軽い色覚変化・消化不良 等  
(これらの症状はどれも一時的な症状ですのでご安心ください。)

## 注意事項

グレープフルーツ(ジュース含む)との飲み合わせが悪い為、内服前後はグレープフルーツの摂取をお控え下さい。

## 処方できない方

- ①タadalafil(シアリスジェネリック)の成分「タadalafil」に対し過敏症の既往歴のある方
- ②硝酸剤又は一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等)を投与中の方
- ③心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる方
- ④不安定狭心症のある患者又は性交中に狭心症を発現したことのある方
- ⑤コントロール不良の不整脈、低血圧(血圧<90/50mmHg)またはコントロール不良の高血圧(安静時血圧>170/100mmHg)のある方
- ⑥心筋梗塞の既往歴が最近3ヵ月以内にある方
- ⑦脳梗塞・脳出血の既往歴が最近6ヵ月以内にある方
- ⑧重度の肝障害のある方
- ⑨網膜色素変性症患者